

Lösungen Vorkenntnistest

1. Eine Vene hat Venenklappen.
 richtig
 falsch
2. In den Venen des Körperkreislaufs wird sauerstoffreiches Blut transportiert, deshalb ist es hellrot.
 richtig
 falsch
3. Wodurch wird das venöse Klappensystem beim Blutrücktransport zum Herzen unterstützt?
Muskelpumpe
4. Eine periphere Verweilkanüle wird nur gelegt, wenn die Patientin/der Patient Medikamente oral nicht einnehmen kann.
 richtig
 falsch
5. Das Legen einer peripheren Verweilkanüle ist für die meisten Menschen schmerzhaft.
 richtig
 falsch
6. Die periphere Verweilkanüle wird erst gewechselt, wenn die Einstichstelle gerötet ist.
 richtig
 falsch
7. Aus hygienischen Gründen benötigt man zwei Pflegefachpersonen, um ein korrektes Vorgehen zu gewährleisten.
 richtig
 falsch
8. Nennen Sie zwei Aspekte, die bei einem aseptischen Verbandswechsel beachtet werden müssen.
Zur Vorbereitung wird das Sterilgut auf Unversehrtheit und Datum kontrolliert.
Der Arbeitsplatz wird in eine sterile und unsterile Seite unterteilt und entsprechend eingerichtet.

9. Der Verband einer peripheren Verweilkanüle muss täglich kontrolliert werden.

richtig

falsch

10. Ein Stauschlauch wird beim Legen einer peripheren Verweilkanüle nur verwendet, wenn die Patientin/der Patient schlecht tastbare Venen hat.

richtig

falsch

11. Zu den hygienischen Richtlinien gehört unter anderem eine einwandfreie Desinfektion der Hände der Pflegefachperson sowie die Berücksichtigung der richtigen Einwirkzeit des Hautdesinfektionsmittels.

richtig

falsch

12. Beim Verbandswechsel stellen Sie fest, dass die periphere Verweilkanüle ca. 0.5 cm aus der Vene herausgerutscht ist. Sie schieben die Verweilkanüle in die Vene zurück und führen den Verbandswechsel zu Ende.

richtig

falsch